

ARRASE, CONQUISTE, CURE

LA
HEPATITIS C
EN SOLO 8
SEMANAS.

Para personas sin
tratamiento previo.

Curar significa que el virus de la hepatitis C no se encuentra en la sangre 3 meses después de haber terminado el tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

USO

MAVYRET es un medicamento de venta con receta que se usa para el tratamiento de adultos y niños de 3 años de edad y más que están infectados con el virus de la hepatitis C (hep C) crónica (prolongada en el tiempo) de genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

No use MAVYRET si tiene determinados problemas de hígado o si está usando los medicamentos atazanavir o rifampina.


Consulte la **Información adicional de seguridad importante, incluido el recuadro de Advertencia sobre la reactivación del virus de la hepatitis B.**


Consulte la **Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente.**

¿QUÉ ES LA HEPATITIS C CRÓNICA?

La hepatitis C es un virus que se multiplica diariamente y puede dañar el hígado con el tiempo.

LA HEPATITIS C...

 puede no causar síntomas

 puede provocar daño hepático


CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD (continuación)


Reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, su médico le hará análisis de sangre para verificar la infección por el virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha estado infectado por el virus de la hepatitis B, este podría activarse de nuevo durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET.

¿QUÉ ES MAVYRET?

MAVYRET detiene el virus de la hepatitis C evitando que se multiplique y lo CURA.

MAVYRET...

 **8 semanas** puede tratar la hep C en solo 8 semanas para las personas que recién comienzan someterse a tratamiento para la hep C

 **consiste en 3 comprimidos que se toman una sola vez por día con alimentos***

*Para adultos, adolescentes de 12 años o más, o niños que pesan al menos 99 libras (45 kg).

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD (continuación)


El virus de la hepatitis B que se activa nuevamente (lo que se denomina reactivación) puede ocasionar problemas de hígado graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. Su médico controlará si está en riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B durante el tratamiento y después de que deje de usar MAVYRET.

¿ESTÁ LISTO PARA CURAR LA HEPATITIS C?

Hable con su médico para obtener más información sobre MAVYRET.

MAVYRET PUEDE CURAR A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS CON HEPATITIS C Y...

 puede adaptarse a su rutina diaria

 se puede tomar en combinación con medicamentos que ayuden a tratar el trastorno por consumo de opioides* y la mayoría de los métodos anticonceptivos


Su médico puede informarle si es seguro tomar MAVYRET con su anticonceptivo.


*Si está tomando naltrexona, hable con su médico para saber si todavía puede tomar MAVYRET.


¿CUÁL ES EL COSTO DE MAVYRET?


El costo no debe interponerse entre usted y su tratamiento.

MAVYRET ESTÁ CUBIERTO POR LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS MÉDICOS...

 **Medicaid:** pague \$20 o menos al mes por MAVYRET, según el plan estatal.

 **Seguro comercial:** podría pagar tan solo \$5 por mes con la tarjeta de ahorros de MAVYRET.

 **myAbbvie Assist:** si no tiene seguro médico, AbbVie podría ayudar

 **PARA SABER LO QUE MAVYRET LE PUEDE COSTAR, LLAME AL 1-877-628-9738.**

Pregúntele a su médico sobre MAVYRET y **CONQUISTE** la hepatitis C.

Aprenda a **CONQUISTAR** la hepatitis C aquí:



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar MAVYRET? Si ha estado infectado con hepatitis B, si tiene problemas de hígado que no sean por infección con hepatitis C, si está infectado con VIH-1, si ha tenido un trasplante de hígado o de riñón, y cualquier otra afección médica.

abbvie

MAVYRET
glecaprevir/pibrentasvir
Comprimidos de 100 mg/40 mg

© 2024 AbbVie. Todos los derechos reservados. MAVYRET® y su diseño son marcas registradas de AbbVie Inc.

US-MAVY-230155

Una vez dije
TENGO hepatitis C.
Ahora puedo decir
que **TUVE**
hepatitis C.

—Danny, **CURADO**
con MAVYRET

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de MAVYRET?

Reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, su médico le hará análisis de sangre para verificar la infección por el virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha estado infectado por el virus de la hepatitis B, este podría activarse de nuevo durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. El virus de la hepatitis B que se activa nuevamente (lo que se denomina reactivación) puede ocasionar problemas de hígado graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. Su médico controlará si está en riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B durante el tratamiento y después de que deje de usar MAVYRET.

No tome MAVYRET si:

- Tiene determinados problemas de hígado
- Está tomando los medicamentos atazanavir o rifampina

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar MAVYRET?

- Si ha estado infectado con hepatitis B, si tiene problemas de hígado que no sean por infección con hepatitis C, si está infectado con VIH-1, si ha tenido un trasplante de hígado o de riñón, y cualquier otra afección médica.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada, o si amamanta o planea amamantar. Se desconoce si MAVYRET puede dañar a un bebé en gestación o si pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma MAVYRET.

• **Acerca de todos los medicamentos que toma**, incluidos los de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. MAVYRET y otros medicamentos pueden afectarse mutuamente. Esto puede hacer que tenga exceso o insuficiencia de MAVYRET u otros medicamentos en el cuerpo. Esto puede afectar la forma en que MAVYRET o los otros medicamentos actúan, o puede ocasionar efectos secundarios.

• **No comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar a su médico.** Su médico puede informarle si es seguro tomar MAVYRET con otros medicamentos.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?

• **En personas que tuvieron o tienen problemas de hígado avanzados antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, existe el riesgo poco frecuente de empeoramiento de problemas de hígado, insuficiencia hepática y muerte.** Su médico lo controlará para detectar signos y síntomas de empeoramiento de problemas de hígado durante el tratamiento con MAVYRET. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes: náuseas, cansancio, coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos, sangrado o moretones más fácilmente que lo normal, confusión, heces oscuras, negras o con sangre, pérdida del apetito, diarrea, orina oscura o marrón (color té), hinchazón o dolor en el lado superior derecho del área del estómago (abdomen), somnolencia, vómitos de sangre, o vahídos.

• Los efectos secundarios más frecuentes de MAVYRET son dolor de cabeza y cansancio.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de MAVYRET. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

Esta es la información más importante que debe conocer acerca de MAVYRET. Para obtener más información, hable con su médico o proveedor de atención médica.

Los gránulos orales de MAVYRET se dispensan en sobres de dosis unitarias. Cada sobre contiene 50 mg de glecaprevir/20 mg de pibrentasvir.

Se le recomienda informar a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.

Consulte la **Información de prescripción completa**, incluida la **Información para el paciente.**

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría brindarle ayuda. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

MAVYRET
no alteró mi
rutina diaria.

—Dianna, **CURADA**
con MAVYRET

MAVYRET consiste en 3 comprimidos que se toman una sola vez por día con alimentos.

Curar significa que el virus de la hepatitis C no se encuentra en la sangre 3 meses después de haber terminado el tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

El medicamento con receta n.º
para la hepatitis C crónica *

*Según los datos de IQVIA, la semana termina del 1/12/2018 al 8/11/2023.



¿Está listo para
escuchar más de otros
pacientes reales?

Visita RelatosdeMavyret.com

para saber cómo es que
otros **CONQUISTARON** y se
CURARON de su hepatitis C
con MAVYRET.

MAVYRET
glecaprevir/pibrentasvir
Comprimidos de 100 mg/40 mg

Curar significa que el virus de la hepatitis C no se encuentra en la sangre 3 meses después de haber terminado el tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.