

¿TIENE HEPATITIS C CRÓNICA?

MAVYRET ES LA ÚNICA CURA* DE 8 SEMANAS
PARA LAS PERSONAS CON HEPATITIS C,
INDEPENDIENTEMENTE DEL GENOTIPO...

... PARA AQUELLOS QUE NO SE HAN TRATADO ANTERIORMENTE,
SIN CIRROSIS O CON CIRROSIS COMPENSADA†

AUN CUANDO NO TENGA SÍNTOMAS,

NO ESPERE PARA HABLAR CON SU MÉDICO

MAVYRET PUEDE CURAR* A LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS
CON HEPATITIS C CRÓNICA EN SOLO 8 SEMANAS...

... para los genotipos 1–6 que no se han tratado
anteriormente, sin cirrosis o con cirrosis compensada†

*El término “cura” significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre 3 meses
después de haber terminado el tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

†Y sin antecedentes de trasplante de hígado o riñón.

USO

MAVYRET es un medicamento de venta con receta que se usa para el tratamiento de adultos y niños de 12 años de edad y más o que pesan al menos 99 libras (45 kilogramos) con infección por el virus de la hepatitis C crónica (prolongada en el tiempo):

- genotipos (GT) 1 a 6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.
- O infección de GT 1 y ha sido tratada previamente con un régimen que incluía un inhibidor de NS5A de la hepatitis C o un inhibidor de la proteasa NS3/4A, pero no ambos.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, su médico le hará análisis de sangre para verificar la infección por el virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha estado infectado por el virus de la hepatitis B, este podría activarse de nuevo durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. El virus de la hepatitis B que se activa nuevamente (lo que se denomina reactivación) puede ocasionar problemas de hígado graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. Su médico controlará si está en riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B durante el tratamiento y después de que deje de usar MAVYRET.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página 4.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta que incluye la Información para pacientes, y hable con su médico.



MAVYRET
glecaprevir/pibrentasvir
Comprimidos de 100 mg/40 mg

PREGÚNTELE A SU MÉDICO ACERCA

DEL MEDICAMENTO RECETADO^{II}

CONTRA LA HEPATITIS C N.º 1 EN EL PAÍS

1 2

^{II}Según datos de recetas minoristas y no minoristas de IQVIA en la semana que finalizó el 1/5/18 al 8/30/19.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE DEBE SABER

En personas que tuvieron o tienen problemas de hígado avanzados antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, existe el riesgo poco frecuente de empeoramiento de problemas de hígado, insuficiencia hepática y muerte. Su médico lo controlará para detectar signos y síntomas de empeoramiento de problemas de hígado durante el tratamiento. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes: náuseas, cansancio, coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos, sangrado o moretones más fácilmente que lo normal, confusión, heces oscuras, negras o con sangre, pérdida del apetito, diarrea, orina oscura o marrón (color té), hinchazón o dolor en el lado superior derecho del área del estómago (abdomen), somnolencia, vómitos de sangre, o vahídos.

SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS



Los efectos secundarios más frecuentes de MAVYRET son dolor de cabeza (13 %) y cansancio (11 %).



Tres de cada 2300 personas aprox. en ensayos clínicos dejaron de tomar MAVYRET debido a los efectos secundarios.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de MAVYRET. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

CON MAVYRET, NO TIENE QUE ENFRENTAR

A LA HEPATITIS C USTED SOLO

Si su médico le receta MAVYRET, la Asistencia al paciente de MAVYRET estará ahí para ayudarlo en cada paso del camino, explicarle en detalle el proceso de seguro y guiarlo hacia los recursos adecuados.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página 4. Consulte la Información de prescripción completa adjunta que incluye la Información para pacientes, y hable con su médico.

MAVYRET 
glecaprevir/pibrentasvir
Comprimidos de 100 mg/40 mg

MAVYRET ESTÁ CUBIERTO POR LA MAYORÍA

DE LOS SEGUROS MÉDICOS, CON COPAGOS

PARA PACIENTES QUE VARÍAN SEGÚN EL PLAN.

El costo no debe interponerse en la búsqueda de una cura.*

Tenga o no tenga un seguro comercial, Medicaid, Medicare (o incluso si no tiene un seguro), la Asistencia al paciente de MAVYRET está siempre lista para ayudarlo a comprender su cobertura y los recursos financieros que podrían estar disponibles para usted. Llame al 1-877-628-9738 para obtener más información.

Con un seguro comercial, podría pagar tan solo **\$5 por mes** con la tarjeta de ahorros de MAVYRET[‡] en MAVYRET.com.



*Se aplican términos y condiciones. Este beneficio cubre a MAVYRET® (glecaprevir y pibrentasvir). Elegibilidad: Disponible para los pacientes con cobertura de seguro comercial de medicamentos de venta con receta para MAVYRET que cumplen con los requisitos de elegibilidad. El programa de asistencia para copago no está disponible para los pacientes que reciben reembolso por medicamentos de venta con receta en virtud de cualquier programa de seguro federal, estatal o financiado por el gobierno (por ejemplo, los programas Medicare [incluida la parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos), o donde lo prohíba la ley o el proveedor del seguro médico del paciente. Si en algún momento un paciente comienza a recibir cobertura de medicamentos de venta con receta en virtud de cualquier programa de atención médica federal, estatal o financiado por el gobierno, el paciente ya no podrá utilizar la tarjeta de copago de MAVYRET y deberá llamar a Asistencia al paciente de MAVYRET al 1-877-628-9738 y suspender el uso de la tarjeta de copago. Es posible que los pacientes que residen o reciben tratamiento en determinados estados no sean elegibles. Los pacientes no pueden solicitar el reembolso del valor recibido a Asistencia al paciente de MAVYRET, incluida la tarjeta de copago de cualquier tercero pagador. Oferta sujeta a cambio o interrupción sin previo aviso. Pueden aplicarse restricciones, incluidas cantidades máximas mensuales. Este no es un seguro médico.

¿ESTÁ LISTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Inicie una conversación con su médico:

- ¿Puede MAVYRET curar* mi hepatitis C?
- No tengo ningún síntoma. ¿Aun así debería recibir tratamiento para mi hepatitis C?
- ¿A quién puedo consultarle respecto del costo?

Visite MAVYRET.com o llame al 1-877-628-9738 para obtener más información.

*El término "cura" significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre 3 meses después de haber terminado el tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página 4.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta que incluye la Información para pacientes, y hable con su médico.

MAVYRET
glecaprevir/pibrentasvir
Comprimidos de 100 mg/40 mg

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de MAVYRET?

Reactivación del virus de la hepatitis B: Antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, su médico le hará análisis de sangre para verificar la infección por el virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha estado infectado por el virus de la hepatitis B, este podría activarse de nuevo durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. El virus de la hepatitis B que se activa nuevamente (lo que se denomina reactivación) puede ocasionar problemas de hígado graves que incluyen la insuficiencia hepática y la muerte. Su médico controlará si está en riesgo de reactivación del virus de la hepatitis B durante el tratamiento y después de que deje de usar MAVYRET.

No tome MAVYRET si:

- Tiene determinados problemas de hígado.
- Está tomando los medicamentos atazanavir o rifampina.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar MAVYRET?

- Si ha estado infectado con hepatitis B, si tiene problemas de hígado que no sean por infección con hepatitis C, si está infectado con VIH-1, si ha tenido un trasplante de hígado o de riñón, y cualquier otra afección médica.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada, o si amamanta o planea amamantar. Se desconoce si MAVYRET puede dañar a un bebé en gestación o si pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma MAVYRET.
- **Acerca de todos los medicamentos que toma,** incluidos los de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. MAVYRET y otros medicamentos pueden afectarse mutuamente. Esto puede hacer que tenga exceso o insuficiencia de MAVYRET u otros medicamentos en el cuerpo. Esto puede afectar la forma en que MAVYRET o los otros medicamentos actúan, o puede ocasionar efectos secundarios.
- **No comience a tomar un nuevo medicamento sin consultar a su médico.** Su médico puede informarle si es seguro tomar MAVYRET con otros medicamentos.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?

- **En personas que tuvieron o tienen problemas de hígado avanzados antes de comenzar el tratamiento con MAVYRET, existe el riesgo poco frecuente de empeoramiento de problemas de hígado, insuficiencia hepática y muerte.** Su médico lo controlará para detectar signos y síntomas de empeoramiento de problemas de hígado durante el tratamiento con MAVYRET. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes:

náuseas, cansancio, coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos, sangrado o moretones más fácilmente que lo normal, confusión, heces oscuras, negras o con sangre, pérdida del apetito, diarrea, orina oscura o marrón (color té), hinchazón o dolor en el lado superior derecho del área del estómago (abdomen), somnolencia, vómitos de sangre, o vahídos.

- Los efectos secundarios más frecuentes de MAVYRET son dolor de cabeza y cansancio.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de MAVYRET. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

Esta es la información más importante que debe conocer acerca de MAVYRET. Para obtener más información, hable con su médico o proveedor de atención médica.

Se le recomienda informar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de cualquier efecto secundario negativo de los fármacos de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al teléfono 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta que incluye la Información para pacientes, y analícela con su médico.

Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría brindarle ayuda. Visite AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Hable con su médico hoy y visite MAVYRET.com para obtener más información.